



A *Sophronia ascalis* Gozmány, 1951 holotípus példánya.

...•••

The holotype specimen of *Sophronia ascalis* Gozmány, 1951.

Gozmány László több mint fél évszázados lepketaxonómiai munkássága különböző, kevésbé ismert molylepkecsaládokra irányult. Az első általa leírt faj a *Sophronia ascalis* volt, ami a Sarlósajkúmoly-féléket (Gelechiidae) képviselte. A típusanyag két pásztói nőstény és egy kaposvári hím példányból állt. Gozmány később megtalálta a fajt Fonyódon és Ócsán is, valószínűleg emiatt kapta a „turjáni sarlós moly” nevet. A Kárpát-medencén kívül kimutatták Észak-Macedóniától kezdve Szlovénián és Ausztrián át egészen Németországig. Legújabban pedig megállapították, hogy a *Sophronia ascalis* a Nyugat-Európából ismert, a *Sophronia ascalis*-nál korábban leírt *Sophronia grandii* Hemming, 1933 fiatalabb társneve.

BÁLINT ZSOLT és KATONA GERGELY, *Állattár*

...•••

László Gozmány worked more than half a century in Lepidoptera taxonomy and focused on various, little-known micromoth families. The first species he described was *Sophronia ascalis*, a member of Gelechiidae (twirler moths). The type material consisted of two females from Pásztó (northeast Hungary) and one male from Kaposvár (southwest Hungary). Gozmány later found the species in Fonyód and Ócsa as well. Outside the Carpathian Basin, the species has been recorded from North Macedonia through Slovenia and Austria to Germany. Most recently, *Sophronia ascalis* was found to be a junior synonym of *Sophronia grandii* Hemming, 1933, a species known from Western Europe.

ZSOLT BÁLINT and GERGELY KATONA, *Department of Zoology*